



DEFORMIDADE ACENTUADA EM VALGO DO JOELHO - DESCRIÇÃO DE NOVA TÉCNICA CIRÚRGICA PARA CORREÇÃO

Autores: Robson Rocha da Silva ¹, Marcos Almeida Matos ¹, Mauricio Pimentel ¹, Bruno Jacomeli Martins ¹, Rafael Valadares Oliveira ¹

Instituição ¹ HSISCM - Hospital Santa Izabel da Santa Casa de Misericórdia da Bahia (Bahia), ² EBMS - Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública (Bahia)

A osteotomia supracondilar varizante do fêmur é o procedimento estabelecido para tratamento do joelho doloroso com artrose lateral e deformidade em valgo. Na descrição das técnicas cirúrgicas convencionais, há divergência com respeito ao local, via de acesso, grau de correção, tipo de fixação e região para colocação da síntese, sendo mais evidente nos casos graves de valgo com angulações acima de 30° e deformação do fêmur distal associado à hipoplasia do côndilo lateral.

Os autores descrevem uma nova técnica cirúrgica de osteotomia femoral distal, baseada em critérios anatômicos e geométricos, desenvolvida no próprio serviço para o tratamento de casos graves de valgo, apresentando um dos casos tratados. A nova técnica consiste em que a cunha a ser ressecada no ato operatório tem direção oblíqua e formato de um triângulo isósceles.

A nova proposta para estes casos pretende, então, resolver os problemas apresentados, trazendo a correção do valgo sem causar uma nova deformidade do fêmur distal. É promovido um bom contato ósseo cortical, além de facilitar a aplicação de um sistema estável de síntese. Entretanto, ainda não se tem idéia dos limites de idade do paciente e do grau de artrose do joelho que possam contraindicar esta cirurgia, necessitando, portanto, de maior casuística e tempo de acompanhamento dos casos operados. Descritores - osteotomia; fêmur; joelho; artrose; técnicas; cirúrgicas; anatômicos.