

## ESTUDO PROSPECTIVO E RANDOMIZADO AVALIANDO O EFEITO DA ADIÇÃO DE TRIANCINOLONA À VISCOSUPLEMENTAÇÃO

**Autores:** Gustavo Constantino de Campos <sup>1</sup>, Márcia Uchôa de Rezende <sup>1</sup>, Alexandre Felício Pailo <sup>1</sup>, Renato Frucchi <sup>1</sup>, Thiago Pasqualim <sup>1</sup>

**Instituição** <sup>1</sup>IOT-FMUSP - Instituto de Ortopedia e Traumatologia da FMUSP (R. Ovidio Pires de Campos, 333).

Avaliar se a adição de triancinolona à viscosuplementação melhora os de curto prazo do procedimento.

Foram avaliados 104 pacientes com osteoartrite (OA) de joelho, divididos aleatoriamente em 2 grupos de 52 pacientes cada. O grupo 1 recebeu uma injeção intra-articular (IA) de 6ml de hylan gf-20 e o grupo 2 recebeu uma ia de 6ml de hylan gf-20 associado a 1ml (20mg) de hexacetonido de triancinolona. Os pacientes responderam os questionários de Womac, Lequesne e VAS nos momentos pré e pós 1, 4, 12 e 24 semanas.

Uma semana após o procedimento o grupo 2 apresentou Womac e VAS com significativamente melhores em comparação ao grupo 1 (P).