

RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO PATELOFEMORAL MEDIAL PARA TRATAMENTO DA LUXAÇÃO RECIDIVANTE DA PATELA

Autores: Matheus Braga Jacques Goncalves ¹, Lucio Honório Carvalho Junior ¹, Luiz Fernando Machado Soares ¹, Thiago Jacques Goncalves ¹, Rogerio Luciano Santos ¹, Marcelo Lobo Pereira ¹

Instituição ¹ HMT - Hospital Madre Teresa de Belo Horizonte (Av. Raja Gabaglia, 1002 - Gutierrez).

Apresentar nova técnica de reconstrução do ligamento patelofemoral medial (LPFM) em pacientes com luxação recidivante da patela e avaliar seus clínicos.

Entre jan/2007 e jan/2008, 23 pacientes foram submetidos à reconstrução do LPFM com enxerto livre de tendão semitendíneo. Após acompanhamento mínimo de 24 meses, 22 pacientes foram avaliados pelos protocolos clínicos de Kujala e de Lysholm.

O seguimento médio foi de 26,2 meses. Segundo o protocolo de Lysholm, os pacientes apresentaram pontuação média de 53,72 pontos no pré-operatório e 93,36 pontos no pós-operatório ($p = 0,000006$). Pelo protocolo de Kujala, a pontuação média foi 59,81 pontos no pré-operatório e 83,54 pontos no pós-operatório ($p = 0,002173$). Conclusão: a reconstrução do ligamento patelofemoral medial pela técnica proposta mostrou excelentes no curto prazo, quando avaliada por protocolos clínicos.