



ARTROSCOPIA DO JOELHO: AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA UTILIZAÇÃO DO HIALURONATO DE SÓDIO INTRA-ARTICULAR ASSOCIADO AO USO DA GLICOSAMINA E CONDROITINA POR VIA ORAL, NO ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO

SESSÃO: ARTROSE / DIA 25/03/2010 - SALA BRENNAND

INSTITUIÇÕES:

FMABC - FACULDADE DE MEDICINA DO ABC

SANTO ANDRÉ / SP - BRASIL

UNIFESP - DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

SÃO PAULO / SP - BRASIL

AUTORES:

ANTONIO MILANI APRESENTADOR

MARCELO S. NAVARRO

OZORIO LIRA

RESUMO

INTRODUÇÃO / OBJETIVOS

NO ALÍVIO DA DOR E SINTOMAS PÓS-OPERATÓRIOS EM CIRURGIAS ARTROSCÓPICAS DO JOELHO, ALGUNS AUTORES RELATAM OS USO DE DROGAS INTRA-ARTICULARES COMO A VISCOSUPLEMENTAÇÃO ATRAVÉS DO HIALURONATO DE SÓDIO INTRA-ARTICULAR.

MATERIAL E MÉTODOS

FORAM ESTUDADOS 98 PACIENTES PORTADORES DE LESÕES MENISCAIS, SUBMETIDOS À CIRURGIA ARTROSCÓPICA COM MENINCECTOMIA PARCIAL DO MENISCO MEDIAL DURANTE O PERÍODO DE MARÇO À NOVEMBRO DE 2007, SEMPRE PELA MESMA EQUIPE CIRÚRGICA. DIVIDIDOS EM 2 GRUPOS ONDE FORAM REALIZADOS USO DE CONDROPROTETORES E VISCOSUPLEMENTAÇÃO EM UM E NO OUTRO NADA FOI REALIZADO.

RESULTADO

FORAM ENCONTRADAS DIFERENÇAS ESTATISTICAMENTE SIGNIFICANTES QUANTO A DOR E SINTOMATOLOGIA NOS DOIS GRUPOS.

CONCLUSÃO

CONCLUÍMOS QUE O TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO COM APLICAÇÕES INTRARTICULARES DE HIALURONATO DE SÓDIO E O USO DA GLICOSAMINA/CONDROITINA NAS CIRURGIAS ARTROSCÓPICAS DO JOELHO POR LESÕES MENISCAIS MOSTROU DIFERENÇA SIGNIFICATIVA COM OS PACIENTES NÃO SUBMETIDOS À ESTA TERAPÊUTICA COMPLEMENTAR.